

## Ahorn; Ær. *Acer pseudoplatanus* L.



TSS - 200007#30



*Ahorn har 8-16 cm brede , 5- lappede blade med spidse indskæringer. Lapperne er groft takkede. Ahorn bliver op til 35 m. Barken afskallende (navnet "pseudoplatanus" betyder falsk platan; den afskallende bark giver træet en vis lighed med en platan). Træet har en ganske stor frøsætning og har derfor meget let ved at spredes.*

Ahorn er oprindelig indført af Johan Georg von Langen efter 1763 til de nordsjællandske skove. Der har dog nok været spredte forekomster af ahorn især i Jylland før den tid; men de første egentlige plantninger i Jylland stammer fra 1880.

Johan von Langen blev på initiativ af Carl Christian Gram (overjægermester og i den egenskab den øverste chef for skovbruget) hentet til Danmark fra Braunschweig for at "genrejse" de danske skove efter de forrige mange århundreders misrøgt: ukontrolleret hugst og udbredt græsning af husdyr i skovene; skovarealet var i 1760 faldet til under 4%. Gram og von Langen tog initiativ til en afprøvning af nye træer (foruden ahorn: hvid-el, rødgran, ædelgran og flere andre nåletræer) og lagde derved grunden til det moderne danske skovbrug.

Blade er ofte angrebet af en sæksporesvamp *Rhytisma acerinum*.

Sommer og efterår sidder der sorte pletter på bladene. Det er svampens ukønnede parasitiske stadium. Det kønnede stadium udvikles i de nedfaldne blade (svampen optræder i dette stadium som nedbryder). I foråret - ved ahornens løvspringstid - viser der sig på de samme blade grupper af blåhvide, spalteformede frugtlegerer (apothecier) i en sort grundmasse. Når sporerne frigives fra frugtlegererne er bladene således klar til en ny infektion.